

**ATMINTINĖ
PRIEŠ IR PO DANTŲ GYDYMO BENDROJOJE NEJAUTROJE
DIENOS CHIRURGIJOS SĄLYGOMIS**

Valgymas ir gėrimas prieš dienos chirurgijos paslaugas

Siekiant išvengti komplikacijų bendros nejautos metu, neduokite pacientui valgyti ir gerti jokių skysčių (net vandens) nejautos išvakarėse po 24 valandos iki pat numatytos procedūros. Nevalykite paciento dantų ryte, nes skalaujant dantis pacientas gali nuryti skalaujamo vandens. Kiekvienas, esantis su pacientu namuose, turi žinoti apie numatomas dienos chirurgijos paslaugas, kad padėtų pacientui. Jeigu pacientas vaikas, kuris dar čiulpia čiulptuką, jo neduokite 6 valandas prieš numatomas dienos chirurgijos paslaugas.

Sveikatos būklė ir jos pasikeitimai

Pacientas, atvykdamas dienos chirurgijos paslaugoms, turi būti visiškai sveikas. Kosulys, karščiavimas, sloga, virusinės kilmės infekcijos ar kitos ligos gali sukelti įvairias komplikacijas. Informuokite gydytojus apie bet kokį paciento sveikatos pasikeitimą. Taip pat nepamirškite informuoti ir apie neseniai persirgtas ligas, alergijas, traumas bei vartotus ar tebevartojamus medikamentus.

Atvykstant dienos chirurgijos paslaugoms, reikia turėti:

- Gydytojo, nustačiusio dienos chirurgijos paslaugų poreikį, siuntimą, įformintą ir išduotą teisės aktų nustatyta tvarka.
- Dokumentus su šių tyrimų rezultatais (tyrimai turi būti atlikti ne vėliau kaip 10 dienų iki dienos chirurgijos paslaugų teikimo dienos):
 - Bendras kraujo tyrimas
 - Kraujo krešėjimo tyrimas
 - Gliukozės kiekio kraujyje tyrimas, esant poreikiui (Taip / Ne (*pažymimas reikiamas*))
 - Elektrokardiograma (EKG)
 - Kalio tyrimas
 - Kiti tyrimai pagal poreikį (*sprendžia gydytojas*) _____

Jeigu pacientas susirgo ar negali atvykti dėl kitų priežasčių, nedelsiant apie tai praneškite paskambinę telefonu: (8-5) 272 7334

Po gydymo bendrojoje nejautroje

Kelias valandas turėsite praleisti ligoninėje. Pirmas 8 val. po gydymo pacientą gali pykinti, jis gali vemti. Sugydyti dantys gali būti jautrūs, burnos minkštieji audiniai gali būti patinę. Jeigu gydymo metu buvo šalinti dantys, gali kraujuoti, pacientas gali nejauti tos vietos dėl vietinio nuskausminimo. Dėl bet kokių sveikatos sutrikimų konsultuokitės su gydančiu gydytoju. Pacientas galės gerti vandenį praėjus 2 val. po procedūros. Rekomenduojama gerti duoti dažnai, bet ne po daug. Vėliau, jeigu paciento nepykins ir jis pageidaus, galima duoti valgyti minkšto, nekaršto maisto.

Nešildykite operuotos vietos. Nevartokite kraujo krešėjimą mažinančių vaistų, jei jų nepaskyrė operacija/gydymą atliksiantis gydytojas.

Pacientą turi lydėti suaugęs žmogus. Jeigu esate vienas, paprašykite, kad kas nors jus pavežtų namo. Napatartina važiuoti visuomeniniu transportu.

Grįžus namo, pacientas dar kurį laiką gali būti mieguistas, apatiškas ar verkšlenantis. Gali būti sutrikęs budrumas, koordinacija, todėl nepalikite paciento vieno. Pirmas dvi paras po gydymo bendrojoje nejautroje neplanuokite jokių išvykų. Leiskite pacientui pailsėti.

Tolimesnis operacinės žaizdos gydymas (tvarkymas, siūlių išėmimas ir kt.) atliekamas poliklinikoje pagal gyvenamą vietą.

Tai labai svarbu paciento sveikatos būklei, todėl informuojame, kad nesilaikant mūsų rekomendacijų galimos rimtos komplikacijos ar net mirtis.

Kilus neaiškumams, prašome konsultuotis su gydančiu gydytoju.

Paskirta dienos chirurgijos paslaugų teikimo data _____